



Indicaties voor CT

Hersenen	Over het algemeen wordt met MRI een beter beeld van de hersenen verkregen dan met CT.
Kop	Oorproblemen, uitwendige gehoorgang en m.n. middenoor, neusholte en bijholtes, ogen en retrobulbaire processen, farynx en larynx.
Wervelkolom	Ontstekingen (discospondylitis), aangeboren afwijkingen, wervelfracturen, metastasen in wervels. Voor de diagnostiek van een hernia heeft men soms meer aan een MRI
Gewrichten	Artrose, LPC, OCD, incongruentie, fissuren en fracturen
Pezen	Ontsteking, degeneratie, ruptuur.
Bot en beenmerg	Exacte omvang van ontstekingen of tumoren; fracturen.
Spieren/weke delen	Tumoren (uitbreiding, wijze van groeien (invasief of niet).
Bekkenholte	Aanvulling op röntgenfoto en echo, m.n. ter vaststelling van omvang van tumoren of ontstekingen: prostaat, cervix, vagina.
Lever, nieren, milt, pancreas, galwegen	Aanvulling op röntgenfoto en echo, m.n. ter vaststelling van omvang van ontstekingen of tumoren.
Thorax, mediastinum, pleuraholte	Aanvulling op röntgenfoto en echo, m.n. ter vaststelling van omvang van ontstekingen of tumoren.